

∞ Corrigé du brevet des collèges 16 septembre 2019 ∞  
**Métropole La Réunion Antilles–Guyane**

**Durée : 2 heures**

**Exercice 1**

**18 points**

1. Le triangle BCD est rectangle en C. Le théorème de Pythagore permet d'écrire :  
 $BD^2 = BC^2 + CD^2$ , soit  $BD^2 = 1,5^2 + 2^2 = 2,25 + 4 = 6,25 = 2,5^2$ .  
Donc  $BD = 2,5$  km.
2. C, D et E sont alignés; le triangle BCD est rectangle en C, donc la droite (BC) est perpendiculaire à la droite (CE).  
Le triangle DEF est rectangle en E, donc la droite (EF) est perpendiculaire à la droite (CE).  
Conclusion : les droites (BC) et (EF) étant perpendiculaires à la droite (CE) sont parallèles.
3. D'après le résultat précédent on peut appliquer le théorème de Thalès :  
 $\frac{DF}{DB} = \frac{DE}{DC} = \frac{EF}{BC}$ , soit  
 $\frac{DF}{2,5} = \frac{5}{2}$ , d'où en multipliant chaque membre par 2,5 :  
 $DF = 2,5 \times 2,5 = 6,25$  km.
4. La longueur totale du parcours est égale à :  
 $AB + BD + DF + FG = 7 + 2,5 + 6,25 + 3,5 = 19,25$  km.
5. Michel parcourt 16 km en 60 min ou 4 km en 15 min ou 1 km en  $\frac{15}{4}$  min.  
Pour parcourir 7 km, il mettra donc  $7 \times \frac{15}{4} = \frac{105}{4}$  min soit  $\frac{105}{4} \times 60 = 1575$  s soit 26 min 15 s.

**Exercice 2**

**14 points**

1.
  - a. 2744 est multiple de 4 :  $2744 = 4 \times 686 = 4 \times 2 \times 343$ .  
Or  $343 = 350 - 7 = 7 \times 50 - 7 \times 1 = 7 \times 49 = 7 \times 7 \times 7$ .  
Donc  $2744 = 2^3 \times 7^3$ .
  - b. Le résultat précédent entraîne :  
 $2744^2 = (2^3 \times 7^3)^2 = (2^3)^2 \times (7^3)^2 = 2^6 \times 7^6$ .
  - c. Inversement le résultat précédent peut s'écrire :  
 $2744^2 = 2^6 \times 7^6 = (2^2)^3 \times (7^2)^3 = (2^2 \times 7^2)^3 = (4 \times 49)^3 = 196^3$ .
2.
  - a. On a donc  $100^3 = b^2$  ou  $1000000 = b^2$ , d'où  $b = 1000$ .
  - b.
    - Si  $a = 3$ ,  $a^3 = 27$  qui n'est pas un carré;
    - Si  $a = 4$ ,  $a^3 = 64$  qui est le carré de 8;
    - Si  $a = 5$ ,  $a^3 = 125$  qui n'est pas un carré;
    - Si  $a = 6$ ,  $a^3 = 216$  qui n'est pas un carré;
    - Si  $a = 7$ ,  $a^3 = 343$  qui n'est pas un carré;
    - Si  $a = 8$ ,  $a^3 = 512$  qui n'est pas un carré;

- Si  $a = 9$ ,  $a^3 = 729$  qui est le carré de 27, mais  $27 > 10$ .  
Il y a donc une solution :  $4^3 = 8^2$ .

### Exercice 3

17 points

- On lit sur le graphique :
  - en 1995 : 360 ppm;
  - en 2005 : 380 ppm.
- Les points de la courbe sont à peu près alignés : le modèle affine semble donc pertinent.
  - Pour l'année 1995, l'expression de Arnold donne  $2 \times 1995 - 3630 = 360$ , et celle de Billy  $2 \times 1995 - 2000 = 1990$  : ce dernier résultat est complètement erroné.  
Il vaut mieux prendre l'expression d'Arnold.
  - Il faut résoudre l'équation :  
 $2x - 3630 = 450$  soit  $2x = 4080$  et  $x = 2040$ .  
La valeur de 450 ppm sera atteinte en 2040.
- Si en 2016, 70 mégatonnes représentent 15 % des émissions  $M$  de carbone, alors :  
 $\frac{15}{100} \times M = 70$ , soit  $M = \frac{70 \times 100}{15} \approx 466,6$ , soit 467 mégatonnes de  $\text{CO}_2$  à la mégatonne près.

### Exercice 4

16 points

- Le ratio est égal à  $\frac{75}{100} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{3}{4}$ .
- On a  $250 = 2,5 \times 100$  : il faut donc multiplier les quantités par 2,5. En particulier il faudra  $30 \times 2,5 = 3 \times 25 = 75$  g de farine.
- Le plus petit gâteau carré a une base carré de côté :  $24 - 8 - 8 = 8$  cm.
- Volume de tour de Pise :  
 $\pi \times 15^2 \times 6 + \pi \times 11^2 \times 6 + \pi \times 7^2 \times 6 + \pi \times 3^2 \times 6 = 6\pi(15^2 + 11^2 + 7^2 + 3^2) = 6\pi(225 + 121 + 49 + 9) = 6\pi \times 404 = 2424\pi \approx 7615 \text{ cm}^3$ .
  - Volume de tour Carrée :  
 $24^2 \times 8 + 16^2 \times 8 + 8^2 \times 8 = 8 \times (24^2 + 16^2 + 8^2) = 8 \times 896 = 7168 \text{ cm}^3$ .  
C'est la tour de Pise qui a le plus grand volume.

### Exercice 5

15 points

- On obtient successivement :  
 $4 \rightarrow 10 \rightarrow 10 \times (4 - 5) = -10 \rightarrow 20$ .
  - On obtient successivement :  
 $-3 \rightarrow 3 \rightarrow 3 \times (-3 - 5) = -24 \rightarrow 6$ .
- On a effectivement  $4 + 4^2 = 4 + 16 = 20$  et  $-3 + (-3)^2 = -3 + 9 = 6$  trouvés précédemment.
  - =B2\*B3

c. En partant de  $x$  on obtient :

$$x \rightarrow x+6 \rightarrow (x+6)(x-5) \rightarrow (x+6)(x-5) + 30 = x^2 - 5x + 6x - 30 + 30 = x^2 + x.$$

d. Il faut résoudre l'équation :

$$x + x^2 = 0 \text{ ou } x(1+x) = 0 \text{ soit } \begin{cases} x & = & 0 \\ 1+x & = & 0 \end{cases} \text{ soit enfin } \begin{cases} x & = & 0 \\ x & = & -1 \end{cases}$$

0 et  $-1$  donnent 0 par le programme de calcul.

## Exercice 6

20 points

1. Armelle peut tirer 2 ou 6 et Basile 1 ou 5 : il ne peut y avoir égalité, donc de match nul.
2.
  - a. Basile a  $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$  chances de sortir un 5 donc de battre Armelle.
  - b. Dans tous les cas Armelle tire un 2 un 6 et tous les deux sont supérieurs à 1 : sa probabilité de battre Basile est donc égale à 1.
3.
  - a. Il y a  $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$  de chances que le nombre tiré soit inférieur à 5 donc que FaceA prenne la valeur 2.
  - b. Si  $\text{FaceB} < \text{FaceA}$  alors
  - c. C'est le même sous-programme que Lancer le dé A en remplaçant Lancer le dé A par Lancer le dé B, 5 par 4 (troisième ligne), 2 par 1 (quatrième ligne) et 6 par 5 (cinquième ligne).
4.
  - a. La fréquence de victoires de A est égale à  $\frac{39901}{39901 + 20099} = \frac{39901}{60000} \approx 0,665$ , soit 67 % à 1 près.
  - b. La probabilité que A gagne contre B est d'environ 66,666 % soit 2 chances sur 3.